

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Bodor Csaba Ferenc
mentőszakpótló




ÚJRAÉLESZTÉS – BLS-AED

ÚJRAÉLESZTÉS - BLS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS

ÁTJÁRHATÓ LÉGÜT
BELÉGZÉS
CKERINGÉS
DEGRENDSZER
E GÉSZ TEST, EGÉSZ ESET



ÚJRAÉLESZTÉS - BLS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS

- Helyszín
- Segélynyújtó
- Áldozat
- Bámészkodók



ÚJRAÉLESZTÉS - BLS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS




ÚJRAÉLESZTÉS - BLS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS

JÓ NAPOT KIVÁNKI SEGÍTHETEK?

+ VÁLL MEGRÁZÁSA

REAGÁL?

NEM

SEGÍTSÉG!




ÚJRAÉLESZTÉS - BLS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS


GYERE SEGÍTS!

- KETTEN BÁTRABBAK VAGYUNK
- KETTEN OKOSABBAK VAGYUNK
- VAN KI TELEFONÁLJON MENTŐÉRT





ÚJRAÉLESZTÉS - BLS **A**

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS



- FEJ HÁTRAHAJTÁSA - ALL EMELESE



ÚJRAÉLESZTÉS - BLS **B**

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
LÉGZÉSVIZSGÁLAT
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS

NÉZD: mellkas ,has mozgását
HALLGASD: a légzés hangját
ÉREZD: levegő áramlását



5 cm



ÚJRAÉLESZTÉS - BLS ¹⁰⁴ **C**



104
MEGKEZDETT
ÚJRAÉLESZTÉS

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS




ÚJRAÉLESZTÉS - BLS **C**

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
30 MELLKASKOMPRESSZIÓ
2 BEFÚVÁS






ÚJRAÉLESZTÉS - BLS **C**

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
30 MELLKASKOMPRESSZIÓ
2 BEFÚVÁS

Helyezzük egyik tenyerünk élét a szegycsontra

- Tegyük rá a másik kezünket
- Kússoljuk össze az ujjainkat
- Nyomjuk a mellkast
 - Ritmus 120/perc
 - Mélység 4-6 cm - 1/3
 - Teljes felengedés!






ÚJRAÉLESZTÉS - BLS


BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
C 30 MELLKASKOMPRESSZIÓ C
2 BEFÚVÁS

- Fogja be az orrot


- Vegyen normális lélegzetet
- Fújjon be, hogy a mellkas emelkedjen
- Engedje a befújt levegőt távozni
- Ismétlje ezeket a lépéseket
- (fél liter levegő)

ÚJRAÉLESZTÉS - BLS





30 : 2



ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

FIBRILLÁCIÓ - DEFIBRILLÁCIÓ

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

Az AED működése

- A ritmus elemzése – sokkoldó ritmuszavar
- Energiaszint kiválasztása
- Hangos figyelmeztetés és körbenézés
- A készülék feltöltése
- Hangos figyelmeztetés és körbenézés
- A sokk leadása



ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK





RENGETEG TÍPUS LÉTEZIK – LIFPACK, ZOLL




ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK



RENGETEG TÍPUS LÉTEZIK – LIFPACK, ZOLL



ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

AED BEKAPCSOLÁSA

- Néhány készülék automatikusan bekapcsol, ahogy felnyitjuk a fedelét.
- Másokat gombnyomással aktiválhatunk.




ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

ELEKTRODÁK FELHELYEZÉSE

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

ELEKTRODÁK FELHELYEZÉSE

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

SENKI NE ÉRJEN A BETEGHEZ!

RITMUSANALÍZIS
SENKI NE ÉRJEN A BETEGHEZ!

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

SENKI NE ÉRJEN A BETEGHEZ!

SHOCK JAVASOLT

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

A SHOCK UTÁNKÖVESSÜK AZ AED HANGUTASÍTÁSAIT

KEZDJEN ÚJRAÉLESZTÉST

30 : 2

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG
ESZMÉLET VIZSGÁLAT
SEGÍTSÉG
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A
B LÉGZÉSVIZSGÁLAT B
104
AED CSATLAKOZTATÁSA
HANGUTATSÍTÁSOK

- A standard AED elsősorban 8 év fölött használható (de a szív elé és mögé, a bal lapocka alá ragasztott elektródhelyezettel 1-8 év között is alkalmazható)
- Speciális, energiátompítóval ellátott, kisméretű elektródlapokkal, ill. gyermekmódra kapcsolt készülékkel 1-8 éves kor között is alkalmazható
- 1 év alatti alkalmazásról nincs adat, ezért nem ajánlott

ÚJRAÉLESZTÉS - AED

BIZTONSÁG	BALESETVÉDELMEM
ESZMÉLET VIZSGÁLAT	
SEGÍTSÉG	<ul style="list-style-type: none"> • AED alkalmazása esetén a beteg főmen és vízben nem feket!
A ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK A	
B LÉGÉSZVIZSGÁLAT B	<ul style="list-style-type: none"> • Az AED-vel egyáltalán nem tudunk ártani a betegnek, egyedül az elsősegélynyújtó sérülhet vagy az a személy, aki a shock leadásakor a beteghez ér
104	
AED CSATLAKOZTATÁSA	
HANGUTATSÍTÁSOK	



LÉGÚTÚTI IDEGENTEST

KÖHÖGÉSRE BÍZTATÁS



5 ERŐTELJES HÁTI ÜTÉS



HEIMLICH-FÉLE MŰFOGÁS



HA SIKERTELEN KEZDJI ÚJRAÉLESZTÉST!!!!



HEIMLICH-FÉLE MŰFOGÁS




HEIMLICH-FÉLE MŰFOGÁS




LÉGÚTÚTI IDEGENTEST

RÉSZLEGES ELZÁRÓDÁS	TELJES ELZÁRÓDÁS
<p>kérdésre verbális válasz, hangos, sípoló köhögési roham légvétel a köhögés előtt arc kipirulása, eltorzulása tisztá tudatállapot, rémült</p>	<p>hangadási képtelenség halk, vagy néma köhögés légzési képtelenség arc elszürkülése romló tudatállapot eszméletvesztés keringés leállása beáll a halál (néhány perc)</p>



EGYSZERŰ LÉGÚTBIZTOSÍTÁS

- FEJ HÁTRAHAJTÁSA
- ÁLL EMELESE

